

# Fleuroselect guldmedaljvinnare för 2007



Kännetecknande för den ettåriga borstnejlikan 'Noverna Clown' är färgvariationen hos blommorna.

## **Coreopsis grandiflora** 'Presto'

Plantan har halvfyllda blommor, men i praktiken producerar den mer fyllda blommor än någon annan sort och blommor också klart längre. Plantan har en perfekt rund växtform med ca 20 cm bredd och höjd, vilket är avvikande från de vanliga *Coreopsis grandiflora*-sorterna som oftast blir omkring 80 cm höga. Ingen retardering behövs för 'Presto' som av naturen är lågväxt. 'Presto' är utmärkt både som utplanteringsväxt och som krukväxt.

Från sådd till blomning är odlingstiden ca 100 dagar. Andra sorter som blommar under det första året är 'Early Sunrise', 'Heliot' och 'Rising



Sun'.

'Presto' har gyllengula blommor, som blir 6 cm i genomskärning. Blommor

'Presto' är en ny typs flicköga.

från juni till augusti. Bladverket är mörkgrönt.

På ett gram går det 350 frön. Odlingstemperatur 15

'Sydney Blue Picotee' är utmärkt till snitt.



grader, omplanteras efter 6 veckor. Planteras ut med avståndet 20 x 20 cm.

## **Delphinium consolida** 'Sydney Blue Picotee'

Blommorna hos denna snittblomma har en unik färgkombination, de är vita med en himmelsblå kant. Precis som de andra sorterna i Sydney-serien har den god förgrening, är tidig och homogen till utseendet samt perfekt för odling i växthus.

De fyllda blommorna blir 2–3 cm stora. Blomningstiden är från maj till oktober. Plantan blir 120 cm hög, upprätt med mörkt gröna blad. På ett gram går det 300–400 frön. Odlingstemperatur 10–15 grader, belysning kan behövas för att få lämplig dagslängd. Planteras ut 3–5 veckor efter sådd, 50–64 stycken per kvadratmeter.

Denna romerska riddarsporre går numera också under det vetenskapliga namnet *Consolida ajacis*.

## **Dianthus barbatus F1** 'Noverna Clown'

Då blommorna slår ut är de vita, men efterhand växlar de färg till pink, laxrosa eller violett. De enskilda blommorna är 1 cm i diameter. Blommor från vår till höst. Plantan är relativt frosttolerant och kan således också säljas till hösten. Den kan växa sig upp till 40 cm hög. Passar bra både i kruka och ute i trädgården.

Precis som den tidigare prisbelönta 'Noverna Purple' behöver plantan ingen vernalisation, utan blommor redan det första året. Sådd i juni ger blommande plantor i slutet av sommaren, höstsådd ger plantor som kan säljas tidigt på våren. Normalt används 9–12 cm stora krukor, men vill man ha tre plantor i samma kruka, skall krukstorleken vara minst 15 cm. Retardering kan vara bra att använda.

Denna utplanteringsväxt blir 35–40 cm hög och 30 cm bred samt buskigt förgrenad. På ett gram går det 1000 frön. Odlingstemperatur 14–18 °C, omkrukas 3–4 veckor efter sådd.

## **Echinacea purpurea** 'Prairie splendor'

Den första fleråriga rudbeckia 'Blue Glitter' är fin till snitt och i trädgården.



ian som blommar till hundra procent under det första året. Blomningstiden börjar redan i slutet av juni och fortgår tills frosten kommer. Plantan blir ca 60 cm hög, alltså minst 20–30 cm lägre än de flesta röda rudbeckior. Det kompaktare växtsättet ger flera möjligheter till användning i trädgården.

Som krukväxt ska man helst ha minst 3–5 plantor i en 3 liters kruka. Om man vill ha blommande krukor till salu på sensommaren, ska man räkna med omkring 10 veckors odlingstid. *Echinacea* kräver riklig gödsling.

De enskilda blommorna är rosenröda. Blommans storlek är 10–15 cm. Det är en perenn som används som utplanteringsväxt. Odlas i 15 graders temperatur. Planteras ut med avståndet 30 x 30 cm. På ett gram går det 270 frön.

## **Eryngium planum** 'Blue Glitter'

En perenn som också ger bra snittblommor för arrangemang i vas. Den 80 cm höga plantan ger blommor som kan användas färskt eller torkade. Jämfört med andra sorter av rysk martorn har 'Blue Glitter' kortare skördetid, större skörd och mer intensiv blå färg.

Odlingstiden från sådd till



'Prairie Splendor', en röd rudbeckia som vann guld.

blommande planta är 16 veckor.

Blomställningarna är rätt små (1–2 cm i diameter), vilket underlättar hantering och transport. Vid odling utomhus till snitt är plantavståndet 30 x 40 cm. Enklare är dock att odla i containers med 3–5 plantor i ett kärl som rymmer 25–40 liter. Krukorna kan också kylla-

gras vid -1 °C och plantan sedan drivs i blom vid 12–18°C. På ett gram går det 850 frön. Kräver ingen kylbehandling.

## **Laurentia hybrida F1** 'Avant-Garde Blue' och 'Avant-Garde Pink'

Sorterna har tidig och riklig blomning jämfört med andra stjärnlobelior. Plantorna är

Laurentia i färgerna 'Avant-garde Pink' och 'Avant-garde Blue'



livskraftiga och blomningstiden lång. Förgreningen är god vid plantbasen och den busklikta plantan blir 25–30 cm hög och 30–35 cm bred. De stjärnformade blommorna täcker hela plantan.

Dessa rätt ovanliga utplanteringsväxter tål värme bra. De passar alltså utmärkt för sydliga Europa och USA och är mycket populära i Japan.

#### ***Pelargonium hortorum*** **'Infiniti Scarlet'**

En frösådd pelargonia med stora blommor (3–4 cm) och

*'Aztec Sunset'* är en guldzinnia som utstrålar värme.



tidig samt långvarig blomning. Odlingstiden är 95 dagar. Den relativt korta odlingsperioden sparar in en del belysningskostnader. 'Infiniti'-serien har också andra färger att erbjuda, bl.a. laxrosa, pink och vit. Frön till dem kommer att fås på senhösten 2006, frön till 'Infiniti Scarlet' finns redan nu.

Plantan blir 30 cm hög och 25 cm bred, upprätt med runda blad. På ett gram går det 200 frön. Odlingstemperatur 15 grader, belysning, krukning osv som för andra frösådda pelargoner.

#### ***Zinnia haageana*** **'Aztec Sunset'**

Sorten har fyllda blommor i två färger. Kompakt växtsätt, god motståndskraft mot mjöldagg. Plantan blir bara 15 cm hög och 25 cm bred, och är nästan helt täckt av blommor.

Denna nya guldzinnia trivs också i lite svalare klimat. Blomstorlek 5 cm. På ett gram går det 600 frön. Odlingstemperatur 18°C.

*'Infini Scarlet'* blommor från början till slut.



## Begränsningar i användning av växtskyddsmedel

Det finns en hel del bestämmelser gällande hur, när och vem som får använda olika bekämpningsmedel. Uppgifter finns på förpackningsetiketterna, som man alltid noga bör läsa genom innan man använder ett bekämpningsmedel. Information finns också på internet, bl.a. i bekämpningsmedelsförteckningen som man kommer fram till via Eviras webbsidor.

### Specialexamen

För växtskyddsmedel, som klassificeras som farliga, behövs en specialexamen för att få inhandla och använda medlet. Sådana är Gusation-sprutmedel, Mesurol 500 SC, Metasystox R, Nikotin-rökband, Regent 80 WDG, Torque.

### Successiv användning

Många växtskyddsmedel är sådana, som inte snabbt bryts ned i marken utan kan anrikas, om de används för ofta. För dem finns begränsningar som gäller användning flera år i rad, t.ex. så att man inte får använda dem två på varandra följande år utan bara vartannat år.

Bland de växtskyddsmedel som kan komma i fråga inom trädgårdsproduktion är följande sådana, som berörs av någon form av begränsning gällande successiv användning:

- ogräsmedlen Afalon, Aramon, Butisan S, Fenix, Stomp, Targa Super 5 EC, Tribunil och Zeppelin
- medel mot växtsjukdomar Baykor, Delan, Rovral, Shirilan, Signum, Switch, Topas 100 EC och Topsin M
- medel mot skadedjur Torque (mot kvalster)

Var alltså extra noga med att kontrollera bestämmelserna för dessa medel.

### Grundvatten

Det finns också växtskyddsmedel som inte får användas på grundvattenområden samt sådana som berörs av vissa begränsningar i fråga om grundvatten. Det kan vara t.ex. ett visst avstånd till vattenkällor eller brunnar som krävs. Det finns också medel som man rekommenderar att ska undvikas på grundvattenområden. Kontrollera alltså alltid bestämmelserna för varje växtskyddsmedel som kan bli aktuellt att använda.

Växtskyddsmedel som berörs av strikta begränsningar i fråga om grundvatten är t.ex. följande:

- ogräsmedlen Basagran SG, Basta, Butisan S, Devrinol 450 SC, Focus Ultra, Fusilade Max, Gallery, Goltix, Lentagran WP, Matrigon, Meta, Select, Senkor
- mot växtsjukdomar Aliette 80 WG, Candit, Previcur N, Scala, Tilt 250 EC, Topas 100 EC
- mot skadedjur Confidor WG 70, Danadim Progress, Metasystox R, Perfekthion 400, Pirimor, R-Dimetoatti BASF, Roxion

Observera att det här ingalunda är heltäckande förteckningar över preparat, som berörs av olika begränsningar och specialbestämmelser. Kontrollera alltid uppgifterna genom att noga läsa etiketten och bruksanvisningarna!