

Des cultures sans pépin



pépinière
horticulture

OPTIMISER LA MULTIPLICATION



fertiss

Motte de multiplication prête à l'emploi.

MAÎTRISER LA PRODUCTION



fertil pot

Godet à base de fibre de bois 100 % perméable aux racines, à l'air et à l'eau.



nutricote

Engrais enrobé à libération progressive, en toute sécurité.



Plant-Prod

...

par exemple, pour animer le début de saison;

- *Agastache astromontana* 'Pink Pop';
- *Attenanthera* 'Purple Knight';
- Amarante Tête d'éléphant;
- *Cosmos sulfureus* Adagio jaune citron;
- *Laurentia* Avant-garde;
- *Petunia* Wonder Blue;
- *Zinnia* Aztec Sunset;
- Tabac Avalon 'Bright Pink';
- *Petunia* 'Ramblin';
- *Emilia coccinea*, petits pompons rouges sur des tiges élevées;
- Irésine 'Purple Lady';
- *Salvia* 'Dancing Flame'.

A confirmer ou à jeter...

Salvia Merleau demande à être essayée à nouveau pour confirmer ses potentialités.

Par contre, les lavatères Trimestris Twins Hot Pink et Novella ont été jugées peu intéressantes.

Déception aussi pour le millet JESTER, qui était pressenti pour compléter la gamme de PURPLE MAJESTIC, mais on en arrive à un produit qui commence à être vraiment petit... ■



La palette végétale utilisée pour le fleurissement des collectivités est de plus en plus vaste. Mais, un gros écrémage a lieu, entre ce qui est mis sur le marché et ce qui est utilisé à grande échelle quelques années plus tard...

P. F.

TERRAIN

Alerte au charançon rouge du palmier

Le charançon rouge du palmier, ou *Rhynchophorus ferrugineus*, est désormais doté d'un diminutif: CRP. C'est dire s'il a déjà vraiment fait son entrée dans l'esprit des gestionnaires de palmiers... C'est dire aussi que ce nouveau ravageur, dont quelques foyers ont été détectés en Corse et en région PACA, fait peur et pourrait causer des dégâts encore plus importants que le papillon *Paysandisia archon* (voir LH n° 41, du 9 novembre 2006).

Une réunion d'information a rassemblé, en décembre, un peu plus de 100 acteurs de la filière palmiers des régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Des mesures de prophylaxie conseillées ont été listées:

tricielle ou d'insecticide homologué, sur les plaies de taille, est vivement recommandée pour empêcher les pontes de CRP.

- Pour les municipalités, former le personnel d'entretien, élagueurs en particulier, à la reconnaissance des symptômes et des différents stades du CRP, connaître la situation sanitaire des plantations récentes de palmiers (3 dernières années) grâce à la pose de pièges et imposer un cahier des charges à leurs fournisseurs en incluant une quarantaine d'un an minimum quelle que soit l'origine des palmiers.

Communication et sensibilisation

Il est également conseillé aux collectivités:

de faire un contact SRPV ou Fredon. A ce jour, en France, il n'existe pas de lutte phytosanitaire validée contre ce ravageur. La solution curative aujourd'hui préconisée est la destruction par le feu ou par déchiquetage des palmiers atteints (contacter le SRPV local pour les précautions à prendre).

Des substances actives insecticides ont été reconnues comme efficaces contre ce coléoptère tant en actions préventive que curative dans les pays contaminés. En raison de l'urgence de la situation, les directeurs des DRAF des régions PACA et Languedoc-Roussillon ont demandé, dans un courrier commun, une dérogation d'usage de 120 jours (renouvelable) sur 2 pro-